




# TROPIK

Un fourrage estival pour sécuriser vos stocks!

3/6  
MOIS



## PEUPELEMENT



## COMPOSITION

50 %	Moha
50 %	Trèfle Squarrosom



**INSTALLATION RAPIDE**  
**FOURRAGE D'ÉTÉ RÉSISTANT À LA SÉCHERESSE**  
**BON ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE**  
**RENDEMENT/PROTÉINE**

**DOSE SEMIS**  
**30**  
 kg/ha

## LES SEMIS

### PÉRIODES DE SEMIS

► De mai à juillet

### PROFONDEUR DE SEMIS

► Semis superficiel

### TYPE DE SOL

► Tous types de sol

### CONSEILS SEMIS

- ✓ Veiller à ce que la parcelle soit propre avant de semer pour limiter le salissement en début de cycle. Possibilité de réaliser un faux-semis ou désherbage en amont de l'implantation.
- ✓ Le lit de semences doit être bien rattaché en profondeur et fin en surface pour permettre un bon contact terre/graine.
- ✓ Roulage après semis conseillé pour uniformiser la levée.
- ✓ Attention pour les parcelles ayant reçu dans l'année un désherbage à base de sulfonilurée : labour obligatoire.



## RÉCOLTE FOURRAGE

► 70 à 80 jours après le semis pour garantir la digestibilité et la qualité alimentaire.

[fourrageres@eliard-spcp.fr](mailto:fourrageres@eliard-spcp.fr)



ZI 9 rue Lavoisier - BP 14 - 56301 PONTIVY Cedex  
Tél : 02 97 25 50 12 - Fax : 02 97 25 65 59  
[eliard-spcp.fr](http://eliard-spcp.fr)

