




LUZIK

Pour une meilleure rusticité

4
ANS

PEUPELEMENT



COMPOSITION

35 %	Luzerne CIGALE
45 %	Luzerne MUSETTE
20 %	Luzerne CELSIUS

L'enrobage de la semence avec un inoculant contenant une bactérie (*sinorhizobium mélioti*) favorisera la fixation symbiotique de l'azote de l'air par nodulation de la luzerne par cette bactérie.



L'ASSOCIATION DE VARIÉTÉS DE LUZERNES INOCULÉES PERMET :

- ▶ **UNE PRODUCTIVITÉ RÉGULIÈRE ET PÉRENNE**
- ▶ **UNE MEILLEURE RUSTICITÉ**
- ▶ **UNE FORTE RÉSISTANCE AUX MALADIES**

DOSE SEMIS
30
kg/ha
15 kg/ha en association avec un trèfle violet, un dactyle ou une fétuque élevée

LES SEMIS

PÉRIODES DE SEMIS

- ▶ Printemps : entre le 15 mars et le 20 avril
- ▶ Fin été : entre mi-août et mi-septembre

PROFONDEUR DE SEMIS

- ▶ Semis superficiel

TYPE DE SOL

- ▶ Sol drainant, avec un pH > 6.5
- ▶ PH inférieur à 6,2 chaulage impératif

CONSEILS SEMIS

Veiller à ce que la parcelle soit propre avant de semer pour limiter le salissement en début de cycle. Possibilité de réaliser un faux-semis ou désherbage en amont de l'implantation. Le lit de semences doit être bien rattaché en profondeur et fin en surface pour permettre un bon contact terre/graine. Roulage après semis conseillé pour uniformiser la levée.



Attention pour les parcelles ayant reçu dans l'année un désherbage à base de sulfonylurée : labour obligatoire.

FERTILISATION

- Veiller à maintenir un pH correct
- « entre 6 et 6.5 » et une bonne teneur en potasse.

RÉCOLTE FOURRAGE

- ▶ En enrubannage, foin, ensilage, en affouragement en vert...
- ▶ En moyenne 3 à 4 coupes/an. La première, fin avril début mai, en ensilage brin long récolté à l'auto-chargeuse en visant 40 % de matière sèche, puis deux coupes en foin et la dernière fin septembre à nouveau en ensilage.

fourrageres@eliard-spcp.fr



ZI 9 rue Lavoisier - BP 14 - 56301 PONTIVY Cedex
Tél : 02 97 25 50 12 - Fax : 02 97 25 65 59
eliard-spcp.fr

